



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 306 824
A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 88114246.7

22 Anmeldetag: 01.09.88

51 Int. Cl. 4: **A61K 37/02 , A61K 37/24 ,
/(A61K37/02,33:14,31:195,
31:17),(A61K37/24,33:14,
31:195,31:17)**

30 Priorität: 05.09.87 DE 3729863

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
15.03.89 Patentblatt 89/11

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

71 Anmelder: **BOEHRINGER MANNHEIM GMBH**
Sandhofer Strasse 116
D-6800 Mannheim 31(DE)

72 Erfinder: **Woog, Heinrich, Dr.rer.nat.**
Lindenstrasse 6
D-6941 Laudenbach(DE)
Erfinder: **Gruber, Werner**
Am Heiligenberg 12
D-6943 Birkenau(DE)
Erfinder: **Markl, Hans-Jörg**
Auf der Kreh 6
D-6701 Ellerstadt(DE)
Erfinder: **Demmer, Fritz, Dr. rer. nat.**
Kastanienweg 21
D-6945 Hirschberg-Leutershausen(DE)

54 Stabilisierte Humanprotein-Präparate.

57 Die Erfindung betrifft verträgliche, lagerstabile Humanprotein-Präparate, enthaltend ein Humanprotein, insbesondere Erythropoietin, physiologisch verträgliche Puffer sowie gegebenenfalls Komplexbildner, Isotonie-einstellende Mittel, Calciumchlorid und andere für Injektionszwecke übliche Stoffe und außerdem in der Injektionsform 5 - 50 g/l Harnstoff, 1 - 50 g/l Aminosäure, 0,05 - 5 g/l nichtionogenes Netzmittel und Verfahren zu ihrer Herstellung.

EP 0 306 824 A2

Stabilisierte Humanprotein-Präparate

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind stabile nicht immunogene, physiologisch gut verträgliche, gelöste oder gefriergetrocknete galenische Zubereitungen von Humanproteinen sowie Verfahren zu deren Herstellung, insbesondere von Erythropoietin.

Humanproteine sind körpereigene, nur in geringen Mengen vorkommende Proteine wie z.B. tissue plasminogen activator (t-PA), Streptokinase, Urokinase, Interferon, verschiedene colony stimulating factors (CSF) oder Erythropoietin (EPO). Am Beispiel des EPO, das bevorzugt in der Formulierung eingesetzt wird, soll die Erfindung näher erläutert werden.

Erythropoietin (EPO) ist ein Glycoprotein, welches die Bildung von Hämoglobin bzw. Erythrocyten im Knochenmark stimuliert. Dies Lipoprotein wird hauptsächlich in der Niere gebildet, findet sich in sehr geringen Mengen im Serum und wird unter physiologischen Bedingungen teilweise im Urin ausgeschieden.

Fehlen des EPO bei Niereninsuffizienz, bedingt mit einer renalen Anämie. Durch Gabe von EPO in physiologischen Mengen, d.h. wenigen Mikrogrammen, in einer oder mehreren Dosierungen, kann die Bildung von Erythrocyten in solchen Fällen wieder angeregt werden. Da der Körper bereits auf geringe Dosisänderungen empfindlich reagiert, muß die Dosierung exakt reproduzierbar sein. Üblicherweise wird EPO als wässrige Lösung entweder i.m. oder i.v. injiziert oder als Spray über die Nasenschleimhaut appliziert.

Es ist jedoch bekannt, daß EPO und zwar sowohl das zunächst aus Humanurin gewonnene Produkt (Miyake et al, J. Biol.Chem.Vol.25, 5558-5564, 1977) als auch die inzwischen gentechnologisch erzeugten Produkte (WO 85-02610) in wässriger Lösung nicht stabil sind und selbst bei einer Lagerung bei -80 °C größere Aktivitätsverluste auftreten. Diese beiden Produkte unterscheiden sich etwas im Glycosilierungsmuster und in der Aktivität, ein direkter Vergleich mit dem im Serum enthaltenen EPO ist bisher nicht bekannt geworden.

Diese Aktivitätsverluste sind einerseits auf eine Zerstörung des EPO durch katalytische Effekte der Oberfläche der zur Aufbewahrung dienenden Ampullen durch Schwermetallspuren, Luftsauerstoff etc. zurückzuführen, andererseits aber auch durch eine Anlagerung der EPO-Moleküle an die Gefäßwand, wobei auch eine teilweise Denaturierung eintreten kann. Da, wie oben gesagt, in jeder Dosiereinheit nur wenige Mikrogramme enthalten sind, können die Verluste durch Adsorption bereits nach kurzer Aufbewahrungszeit beträchtlich sein.

In der EP-A 178 576 ist daher beschrieben worden, durch Zusatz von polymeren Verbindungen, wie Human- oder Rinderserumalbumin, Lecitin, Dextran, Cellulose, Polyethylenglycol etc. diese Anlagerung an die Gefäßwand zu inhibieren, und damit eine Wiederfindung von EPO zu 75-98 % nach ca. 2 h Lagerung bei 20 °C zu erzielen, gegenüber nur 16 % ohne solchen Zusatz. Gemessen wurde dabei allerdings nur die Wiederfindung einer radioaktiven Markierung (¹⁴C), so daß diese Versuche nichts über die Stabilisierung des EPO gegen Zersetzung aussagen.

Nach unseren Befunden ist eine Langzeitstabilisierung mit solchen Mitteln jedoch nicht zu erzielen, d.h. die EPO-Wirksamkeit im Maus-Test nimmt stark ab, zudem können diese Mittel bei der Injektion immunogene Reaktionen hervorrufen.

Aus der EP-A 178 665 sind weiterhin "Stabilisatoren", insbesondere für gefriergetrocknete EPO-Präparate bekannte. Neben den polymeren Substanzen PEG 4000, Gelatine und Dextran 40, sind verschiedene Zucker und Zuckeralkohole, Aminosäuren, anorganische Salze und Thiolverbindungen genannt. Kombinationen dieser Stoffe mit Humanserumalbumin, Gelatine und Dextran sind ebenfalls genannt. Auch in dieser Literaturstelle wird nur die Wiederfindung der Radioaktivitäten nach 2 Monaten Lagerung der gefriergetrockneten Produkte bestimmt. Diese wird mit 87-99 % angegeben, gegenüber 60 % ohne Zusatz. Da das lyophilisierte Material direkt nach der Herstellung als Standard benutzt wurde ist nicht angegeben, wie hoch die Aktivitätsverluste bei der Herstellung der Präparate sind. Auch diese Präparate weisen einen hohen Wirksamkeitsverlust im Maus-Test auf.

Es stellte sich daher die Aufgabe, ein gutverträgliches EPO-Präparat zu finden, welches lagerstabil ist, d.h. die in-vivo Wirksamkeit bewahrt, nicht zu Adsorptionen an den Ampullen- oder Spritzenwänden führt und leicht in eine injizierbare Form gebracht werden kann.

Überraschenderweise wird diese Aufgabe durch eine in den Ansprüchen näher gekennzeichnete Kombination verschiedener Komponenten gelöst. Wie unsere Versuche gezeigt haben, besitzen die Einzelstoffe diese Eigenschaften nicht oder nur in geringerem Ausmaß.

Entscheidend für die Stabilisierung ist der Zusatz von Harnstoff und verschiedenen Aminosäuren. Harnstoff wird in 5-50 g/l, vorzugsweise 10-15 g/l eingesetzt. Als Aminosäuren seien beispielsweise Glycin, L-Alanin, L-Arginin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-2-Phenylalanin, L-Glutaminsäure oder L-Threonin genannt.

Mischungen der verschiedenen Aminosäuren scheinen einen besonders vorteilhaften Effekt zu haben. Die jeweiligen Aminosäuren werden in Mengen von 0,5-50 g/l, vorzugsweise 1-20 g/l eingesetzt, wobei die Gesamtmenge der Aminosäure vorzugsweise 5-25 g/l betragen soll.

Notwendig ist ferner ein physiologisch verträglicher Puffer, welcher in der für Injektionslösungen erforderlichen geringen Konzentrationen (ca. 20-100 mMol/l) den für EPO erforderlichen pH-Bereich von 6,5-7,4, insbesondere 7,0-7,2 einstellt. Außer Phosphatpuffern sind auch Glycinat, Carbonat, Citrat u.a. brauchbar, wobei außer Natrium- auch Kalium- oder Ammoniumionen als Gegenion dienen können. Eine Pufferung wird zusätzlich durch die enthaltenen Aminosäuren bewirkt.

Die Haftung des EPO an den Ampullenwandungen und Spritzen wird wesentlich herabgesetzt durch Zusatz geringer Mengen eines Detergenz. Da das Präparat vorwiegend injiziert werden soll, muß dieser Stoff physiologisch, insbesondere i.v. verträglich sein. Konzentrationen von 0,05-5 g/l, insbesondere 0,1-0,5 g haben sich bewährt. Nichtionogene Netzmittel, wie die verschiedenen Polymacrogol-Arten, insbesondere Polyethylensorbitanlaurat (Tween 20 oder 80) oder Sorbitantrioleat (Span 35 oder 80) oder Glycerin oleylsäurepolyglycoether (Labrafil[®]) haben sich zu diesem Zweck bewährt, andere verträgliche Stoffe können jedoch gleichermaßen eingesetzt werden.

Um den Einfluß von Schwermetallionen - die fast unvermeidlich bei der Verarbeitung, z.B. aus den verwendeten Metallgeräten, eingeschleppt werden, auf das EPO zu verringern, hat es sich ferner bewährt, der Lösung noch 0,01 - 5 g/l eines löslichen Calciumsalzes, vorzugsweise etwa 0,02-0,2 g/l Calciumchlorid zuzusetzen. Andere physiologisch verträgliche Komplexbildner, beispielsweise Citrat, EDTA, NTA, Panthotat können ebenfalls eingesetzt werden.

Als Lösungsmittel wird reines Wasser für Injektionszwecke verwendet, dem zur Einstellung der Isotonie noch 0,5-10 g/l Natriumchlorid oder entsprechende Stoffe, wie Mannit, Sorbit etc. zugesetzt werden.

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Präparate werden alle Hilfsstoffe in der notwendigen Menge Wasser gelöst, die EPO-Präparation, die eine Aktivität von ca. 100.000 bis 200.000 Units/mg Protein aufweisen sollte, zugemischt, in entsprechende Ampullen sterilfiltriert, eingefroren und schonend bei tiefen Temperaturen lyophilisiert. Die erhaltenen Präparate sind unter Stickstoff über 2 Jahre bei 0°C und über 1 Jahr bei Raumtemperatur haltbar. Beim Rekonstituieren mit Wasser lösen sie sich in wenigen Sekunden ohne Trübung auf und können so entweder direkt intravenös oder intramuskulär injiziert oder nach Verdünnung mit isotonischen Lösungen (z.B. Kochsalzlösung) infundiert werden.

Dem Einfriervorgang kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Hilfsstoffe werden in Art und Menge so gewählt, daß der eutektische Punkt der einzufrierenden Lösung zwischen -50 bis -30°C liegt. Mit Hilfe eines computergesteuerten Optimierungsprogramms wurden folgende optimale Bedingungen für die 3 Phasen der Lyophilisation ermittelt:

Einfrierzeit

12 - 14 Stunden bei -40°C

40

Haupttrocknung:

Soletemperatur +10°C, Druck 10^{-1} mbar, Zeit 48-60 Stunden

45

Nachtrocknung:

50 Soletemperatur +20°C, Druck 10^{-3} mbar, Zeit 4-6 Stunden.

Hierbei ist es wesentlich mit Hilfe einer Δp -Messungsvorrichtung sowie einer Leitfähigkeitsmessung zu erkennen, wann die Haupttrocknung abgeschlossen ist, damit das zu lyophilisierende Produkt nicht zu schnell erwärmt wird und ein Auftauen der eingefrorenen Lösung und der damit verbundene Aktivitätsverlust vermieden wird.

Die eingesetzten Hilfsstoffe sind so ausgewählt worden, daß ein gleichmäßig strukturierter zu lyophilisierender Eiskörper zustande kommt und daß während der Lyophilisation ein poröses Gerüst (Kuchen) erhalten wird, aus dem eine optimale Sublimation des Eises, vor allem auch gegen Ende der Haupttrock-

nung, möglich ist. Die Nachtrocknung erfolgt wie oben genannt bei nur $+20^{\circ}\text{C}$ über 4-6 Std. Diese schonende Behandlung ist wichtig, da es sonst zu einem Verlust der Aktivität beim zu lyophilisierenden Gut kommt.

In der Regel haben die so lyophilisierten Produkte einen Wassergehalt von etwa 2-5 % nach Karl Fischer. Dieser Restwassergehalt hängt von Art und Menge der Hilfsstoffe ab, die in der betreffenden Rezeptur eingesetzt werden.

Die wäßrigen Lösungen des stabilisierten EPO können auch direkt in Ampullen abgefüllt werden und ohne Lyophilisation als gebrauchsfertige Form in den Verkehr gebracht werden. Die Haltbarkeit ist dadurch jedoch gegenüber dem Lyophilisat verkürzt auf ca. 1 Jahr bei 0°C und einige Monate bei Raumtemperatur.

Nachfolgende Beispiele sollen das oben geschilderte näher erläutern:

Beispiel 1

Erythropoietin 2000 Units Injektionstrockensubstanz (Ansatz für 35.000 Flaschen)

In einem sterilen, mit Rührwerk versehenen 100 l V2A-Doppelmantelkessel werden die Hilfsstoffe gelöst:

Harnstoff	700,0 g	
Natriumchlorid	70,0 g	
Tween 20	7,0 g	
Natriumdihydrogenphosphat x $1\text{H}_2\text{O}$	38,4 g	
Dinatriumhydrogenphosphat x $2\text{H}_2\text{O}$	350,0 g	
Calciumchlorid x $2\text{H}_2\text{O}$	8,4 g	
Glycin	105,0 g	
L-Leucin	140,0 g	
L-Isoleucin	140,0 g	
L-Threonin	35,0 g	
L-Glutaminsäure	35,0 g	
L-Phenylalanin	70,0 g	
Wasser f. Injektionszwecke ad	70,0 l	

Zu 30 l dieser Hilfsstofflösung werden 214,3 ml einer Erythropoietin-Rohstoffcharge mit einem EPO-Titer von 140.000 Units/ml gegeben und zum Endvolumen von 35 l aufgefüllt und durchgerührt. Mit der restlichen Hilfsstofflösung wird das Filtrationssystem gespült. Die Ansatzlösung wird über ein Membranfilter $0,2\text{ }\mu\text{m}$ Porenweite sterilfiltriert. Die sterilfiltrierte Lösung wird zu 1 ml Injektionsflaschen unter aseptischen Bedingungen abgefüllt und unter folgenden Kriterien in einer Lyophilisationsanlage gefriergetrocknet:

Einfrierzeit

12 - 14 Stunden bei -40°C

Haupttrocknung:

Soletemperatur $+10^{\circ}\text{C}$, Druck 10^{-1} mbar Zeit 48-60 Stunden

Nachtrocknung:

Soletemperatur +20 °C, Druck 10^{-3} mbar Zeit 4-6 Stunden

- 5 Man erhält so eine voluminöse, offenporige Injektionstrockensubstanz, die mindestens 2 Jahre im Kühlschrank und 1 Jahr bei Raumtemperatur haltbar ist und sich innerhalb von einigen Stunden in 2 ml Wasser für Injektionszwecke ohne Trübung und frei von Partikeln löst.

10

Beispiel 2

- 15 Erythropoietin-Lyophilisat 200 Units (Ansatz für 35.000 Flaschen)

Erythropoietin	46,7 ml = 7 Mio Units
Natriumchlorid	100,0 g
Tween 20	10,0 g
20 Natriumdihydrogenphosphat x $1\text{H}_2\text{O}$	155,0 g
Dinatriumhydrogenphosphat x $2\text{H}_2\text{O}$	500,0 g
Calciumchlorid x $2\text{H}_2\text{O}$	10,0 g
Harnstoff	1000,0 g
L-Leucin	150,0 g
25 L-Threonin	120,0 g
L-Phenylalanin	165,0 g
Wasser f. Injektionszwecke ad	70,0 l

- Die Hilfsstoffe werden in 70 l Wasser für Injektionszwecke gelöst und danach in 2 Portionen auf 35 l aufgeteilt. Die ersten 35 l werden mit der erforderlichen Menge EP0-Wirkstoff versetzt. Die zweiten 35 l werden zum Spülen des Filtrationssystems verwendet. Die Ansatzlösung wird über ein Membranfilter 0,2 µm Porenweite sterilfiltriert. Die sterilfiltrierte Lösung wird zu 1 ml Injektionsflaschen unter aseptischen Bedingungen abgefüllt und unter den gleichen Kriterien lyophilisiert wie im Beispiel 1 angegeben. Man erhält so ein weißes, poröses, in 2 ml Wasser gut lösliches Lyophilisat, das 2 Jahre im Kühlschrank oder 1 Jahr bei Raumtemperatur ohne großen Aktivitätsverlust gelagert werden kann.

35

Beispiel 3

40

Erythropoietin Lyophilisat 1000 Units (Ansatz für 35.000 Flaschen)

45 Erythropoietin	233,33 ml = 35 Mio Units
Natriumchlorid	100,0 g
Tween 20	12,0 g
Natriumdihydrogenphosphat x H_2O	140,0 g
Dinatriumhydrogenphosphat x $2\text{H}_2\text{O}$	450,0 g
50 Calciumchlorid x $2\text{H}_2\text{O}$	10,0 g
Harnstoff	700,0 g
Glycin	1050,0 g
L-Leucin	92,0 g
L-Glutaminsäure	103,0 g
55 L-Phenylalanin	115,5 g
Wasser f. Injektionszwecke ad	70,0 l

Die Hilfsstoffe werden in 70 l Wasser für Injektionszwecke gelöst und danach in 2 Portionen auf 35 l

aufgeteilt. Die ersten 35 l werden mit der erforderlichen Menge EP0-Wirkstoff versetzt. Die zweiten 35 l werden zum Spülen des Filtrationssystems verwendet. Die Ansatzlösung wird über ein Membranfilter 0.2 µm Porenweite sterilfiltriert. Die sterilfiltrierte Lösung wird zu 1 ml Injektionsflaschen unter aseptischen Bedingungen abgefüllt und unter den gleichen Kriterien lyophilisiert wie im Beispiel 1 angegeben. Man erhält so ein weißes, poröses, in 2 ml Wasser gut lösliches Lyophilisat, das 2 Jahre im Kühlschrank oder 1 Jahr bei Raumtemperatur ohne großen Aktivitätsverlust gelagert werden kann.

Beispiel 4

Erythropoietin Lyophilisat 500 Units (Ansatz für 35.000 Flaschen)

Erythropoietin 116,67 ml = 17,5 Mio Units
 Natriumchlorid 70,0 g
 Tween 20 7,0 g
 Natriumdihydrogenphosphat x H₂O 38,5 g
 Dinatriumhydrogenphosphat x 2H₂O 490,0 g
 Calciumchlorid x 2H₂O 5,6 g
 Harnstoff 840,0 g
 L-Leucin 92,4 g
 L-Glutaminsäure 105,0 g
 L-Phenylalanin 119,0 g
 Wasser f. Injektionszwecke ad 70,0 l

Die Hilfsstoffe werden in 70 l Wasser für Injektionszwecke gelöst und danach in 2 Portionen auf 35 l aufgeteilt. Die ersten 35 l werden mit der erforderlichen Menge EP0-Wirkstoff versetzt. Die zweiten 35 l werden zum Spülen des Filtrationssystems verwendet. Die Ansatzlösung wird über ein Membranfilter 0.2 µm Porenweite sterilfiltriert. Die sterilfiltrierte Lösung wird zu 1 ml Injektionsflaschen unter aseptischen Bedingungen abgefüllt und unter den gleichen Kriterien lyophilisiert wie im Beispiel 1 angegeben. Man erhält so ein weißes, poröses, in 2 ml Wasser gut lösliches Lyophilisat, das 2 Jahre im Kühlschrank oder 1 Jahr bei Raumtemperatur ohne großen Aktivitätsverlust gelagert werden kann.

Beispiel 5

Erythropoietin Lyophilisat 750 Units (Ansatz für 35.000 Flaschen)

Erythropoietin 175,0 ml = 26,25 Mio Units
 Natriumchlorid 100,0 g
 Tween 20 12,0 g
 Natriumdihydrogenphosphat x H₂O 140,0 g
 Dinatriumhydrogenphosphat x 2H₂O 450,0 g
 Calciumchlorid x 2H₂O 10,0 g
 Glycin 1250,0 g
 L-Isoleucin 98,0 g
 L-Glutaminsäure 130,0 g
 L-Phenylalanin 145,0 g
 Wasser f. Injektionszwecke ad 70,0 l

Die Hilfsstoffe werden in 70 l Wasser für Injektionszwecke gelöst und danach in 2 Portionen auf 35 l aufgeteilt. Die ersten 35 l werden mit der erforderlichen Menge EP0-Wirkstoff versetzt. Die zweiten 35 l werden zum Spülen des Filtrationssystems verwendet. Die Ansatzlösung wird über ein Membranfilter 0.2

um Porenweite sterilfiltriert. Die sterilfiltrierte Lösung wird zu 1 ml Injektionsflaschen unter aseptischen Bedingungen abgefüllt und unter den gleichen Kriterien lyophilisiert wie im Beispiel 1 angegeben. Man erhält so ein weißes, poröses, in 2 ml Wasser gut lösliches Lyophilisat, das 2 Jahre im Kühlschrank oder 1 Jahr bei Raumtemperatur ohne großen Aktivitätsverlust gelagert werden kann.

5

Beispiel 6

10 Um die Wirksamkeit verschiedener Stabilisatoren zu testen, wurde eine Standardrezeptur mit 1000 U EPO/ml, welche als Hauptstabilisator Harnstoff enthält, mit Polyvinylpyrrolidon/Eiweiß bzw. verschiedenen Aminosäuren versetzt und die Produkte lyophilisiert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Die Stabilität von EPO wurde nach 6 Wochen Lagerung des Lyophilisats bei 35 °C bzw. 0 °C im Maus-Milz-Test gemäß der Vorschrift von G. Krystal in Exp. Hematol. 11, 649-660 (1983) wie folgt bestimmt:

15 B₆C₃F₁-Mäusen, weiblich, Gewicht ca. 20 g (Zentrallinstitut für Versuchstierkunde, Hannover) wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 60 mg/kg Phenylhydrazinhydrochlorid i.p. injiziert. Nach 3 weiteren Tagen wird die Milz entnommen, die Milzzellen werden in sterilem Komplettmedium (Dulbecco Modified Eagle's Medium + 584,0 mg/l L-Glutamin + 0,1 m Mol/l 2-Mercaptoäthanol + 20 % fötales Kälberserum) suspendiert und auf 4 x 10⁶ kernhaltige Zellen/ml verdünnt. Die Suspension, der zuvor die Testsubstanz
20 bzw. der EPO-Standard in jeweils geeigneten Konzentrationen, gelöst in BSA-Puffer, zugesetzt wurden, wird in Mikrotiterplatten verteilt (0,2 ml/Vertiefung). Nach Inkubation (22 Stunden, 37 °C, Luft + 15 % CO₂) werden 20 l ³H-Methyl-Thymidin-Lösung mit Ci pro Vertiefung zugegeben und erneut 2 Stunden bei 37 °C inkubiert. Danach wird der Inhalt mit Hilfe eines Zell-Harvesters überführt und mit destilliertem Wasser gewaschen. Der Einbau von ³H-Thymidin wird mit einem β -Scintillationszähler bestimmt und gegen die
25 Standardpräparate ausgewertet.

Als Working Standard wurde der "POO9-EPO-Standard" von Genetics Institute, Cambridge, Massachusetts, USA, der 112 U EPO/ml (und 503 ng Protein/ml) enthielt (abgeglichen gegen den EPO-Referenz-Standard der WHO "International Reference Preparation of Erythropoietin, Human, Urinary for Bioassay (2nd I.R.P., established 1971)" verwendet. Die Standardkonzentrationen lagen im Bereich von 10-100
30 mU/ml.

Die auf ihre EPO-Aktivität zu testenden Lyophilisate wurden zunächst je Ampulle in 2 ml Wasser für Injektionszwecke gelöst, die weiteren Verdünnungen erfolgten - ebenso wie bei dem Working Standard - mit BSA-Puffer (8,75 g NaCl 1,95 g CaCl₂ x 2H₂O, 1,00 g BSA (bovine serum albumin der Fa. Calbiochem), Wasser für Injektionszwecke ad 1 l). ³H-Methyl-Thymidin (spezifische Aktivität: 2 Ci/mmol) wurde von New
35 England Nuclear bezogen.

Beispiel 7

40 In gleicher Weise wie in Beispiel 6 wurde eine etwas abgewandelte Stammrezeptur mit Harnstoff und verschiedenen Aminosäuren bzw. Gemischen versetzt. Zum Vergleich wurden zwei Mannithaltige Rezepturen, welche EP 178665 entsprechen, mitgeprüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

45

50

55

Tabelle 1

Zusammensetzung	1	a	b	ab
mg: Fläschchen	819892 G	819893 H	819894 I	819895 K
Erythropoietin	1000 U	1000 U	1000 U	1000 U
Harnstoff	10,0	10,0	10,0	10,0
Natriumchlorid	9,0	4,0	9,0	1,0
Tween 20	0,1	0,1	0,1	0,1
Na-dihydrogenphosphat x H ₂ O	0,55	0,55	0,55	0,55
Di-Na-hydrogenphosphat x 2H ₂ O	5,0	5,0	5,0	5,0
CaCl ₂ x 2H ₂ O	0,08	0,08	0,08	0,08
Kollidon 12 PF	5,0	-	5,0	-
Gelafundin	1,0	1,0	-	-
Glycin	-	15,0	-	15,0
L-Leucin	-	-	2,0	2,0
L-Isoleucin	-	-	2,0	2,0
L-Threonin	-	-	0,5	0,5
L-Glutaminsäure	-	-	0,5	0,5
L-Phenylalanin	-	-	1,0	1,0
Wasser	ad 1,0 ml	ad 1,0 ml	ad 1,0 ml	ad 1,0 ml
Stabilität 25 ° C	493	869	934	1128
Stabilität 0 ° C	985	1114	1144	1205

Tabelle 2

Vers.-Nr.	895	896	897	898	899	900	901	902	903
<u>Zusammensetzung in mg/ml</u>									
EPO, Charge: P007	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U
Natriumchlorid	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tween 20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Na-Dihydrogenphosphat x H ₂ O	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
DiNa-hydrogenphosphat x 2 H ₂ O	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Calciumchlorid x 2 H ₂ O	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Mannit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harnstoff	-	10	-	10	-	10	-	10	-
Glycin	15,0	-	15	-	15	-	15	-	15
L-Leucin(1/100 m molar)	-	-	1,32	1,32	-	-	1,32	1,32	-
L-Isoleucin	1,32	1,32	-	-	1,32	1,32	-	-	1,32
L-Threonin	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	-
L-Glutaminsäure	1,47	1,47	1,47	1,47	-	-	-	-	1,47
L-Phenylalanin	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
L-Arginin	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	-
NaH ₂ PO ₄ x H ₂ O	1,0	1,0	-	1,0	2	2	2	2	-
Na ₂ HPO ₄ x 2 H ₂ O	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Wasser p.i. ad	1,0 ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml
Stabilität 25°C	164	185	150	234	170	229	226	226	229
Stabilität 0°C	182	203	203	242	208	234	232	230	230

Tabelle 2 (Fortsetzung)

Vers.-Nr.	904	905	906	907	908	909	910	911	912
<u>Zusammensetzung in mg/ml</u>									
EPO, Charge: P007	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U	250 U
Natriumchlorid	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tween 20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Na-Dihydrogenphosphat x H ₂ O	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
DiNa-hydrogenphosphat x 2 H ₂ O	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Calciumchlorid x 2 H ₂ O	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Mannit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harnstoff	10	-	10	-	10	-	10	10	-
Glycin	-	15	-	15	-	15	-	15	15
L-Leucin (1/100 m molar)	-	1,32	1,32	-	-	1,32	1,32	2	-
L-Isoleucin	1,32	-	-	1,32	1,32	-	-	2	-
L-Threonin	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	-
L-Glutaminsäure	1,47	1,47	1,47	-	-	-	-	0,5	-
L-Phenylalanin	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,0	-
L-Arginin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NaH ₂ PO ₄ x H ₂ O	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Na ₂ HPO ₄ x 2 H ₂ O	5	7	5	-	-	-	-	-	-
Wasser p.i. ad	1,0 ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml	1,0ml
Stabilität 25°C	205	221	258	205	216	171	-	256	175
Stabilität 0°C	167	220	291	188	210	197	240	234	218

Tabelle 2 (Fortsetzung)

Vers.-Nr.	982	576	575
<u>Zusammensetzung in mg/ml</u>			
EPO, Charge: P007	250 U	250 U	250 U
Natriumchlorid	1,0	4	4
Tween 20	0,1	0,1	0,5
Na-Dihydrogenphosphat x H ₂ O	0,55	0,55	0,55
DiNa-hydrogenphosphat x 2 H ₂ O	5,0	5,0	5,0
Calciumchlorid x 2 H ₂ O	0,08	0,08	0,08
Mannit	-	20	30
Harnstoff	10	-	-
Glycin	-	10	-
L-Leucin (1/100 m molar)	-	-	-
L-Isoleucin	-	-	-
L-Threonin	-	-	-
L-Glutaminsäure	-	-	-
L- Phenylalanin	-	-	-
L-Arginin	-	-	-
NaH ₂ PO ₄ x H ₂ O	1	-	-
Na ₂ HPO ₄ x 2 H ₂ O	-	-	-
Wasser p.i. ad	1,0ml	1,0ml	1,0ml
Stabilität 25°C	120	134	97
Stabilität 0°C	195	172	178

Ansprüche

5

1. Verträgliches, lagerstables Humanprotein-Präparat, enthaltend ein Humanprotein, physiologisch verträgliche Puffer sowie gegebenenfalls Komplexbildner, Isotonie-einstellende Mittel, Calciumchlorid und andere für Injektionszwecke übliche Stoffe, dadurch gekennzeichnet, daß in der Injektionsform

5 - 50 g/l Harnstoff

10 1 - 50 g/l Aminosäure

0,05 - 5 g/l nichtionogenes Netzmittel
enthalten ist.

2. Humanprotein-Präparat gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Aminosäure eine Mischung ist, die mindestens zwei der Aminosäure Glycin, L-Alanin, L-Isoleucin, L-Arginin, L-Leucin, L-2-
15 Phenylalanin, L-Glutaminsäure oder L-Threonin enthält.

3. Humanprotein-Präparat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Netzmittel Polyethylensorbitanlaurat eingesetzt wird.

4. Humanprotein-Präparat nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Präparat in lyophilisierter Form vorliegt.

20 5. Humanprotein-Präparat nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Präparat in flüssiger, spritzfertiger Form vorliegt.

6. Humanprotein-Präparat nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß pro Injektionsdosiseinheit von 1 - 5 ml 100 - 1 Million U Humanprotein enthalten sind.

7. Humanprotein-Präparat nach einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß das
25 Humanprotein Erythropoietin ist.

8. Humanprotein-Präparat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß pro Injektionsdosiseinheit von 1 - 5 ml 100 - 20 000 U Erythropoietin enthalten sind.

9. Verfahren zur Herstellung von verträglichen, lagerstabilen Humanprotein-Präparaten, enthaltend ein Humanprotein, physiologisch verträgliche Puffer sowie gegebenenfalls Komplexbildner, Isotonie einstellende
30 Mittel, Calciumchlorid und andere für Injektionszwecke übliche Stoffe, dadurch gekennzeichnet, daß man zunächst eine Lösung von 5 - 50 mg/l Harnstoff, 1 - 50 g/l Aminosäure und 0,05 - 5 g/l nichtionogenes Netzmittel herstelle, zu dieser Lösung übliche Hilfsstoffe fügt und anschließend das Humanprotein be-
mischt.

10. Verfahren zur Herstellung eines Präparates gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das
35 Humanprotein Erythropoietin ist.

11. Verfahren zur Herstellung eines Erythropoietin-Präparates gemäß Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst alle Hilfsstoffe in Wasser gelöst werden, das Erythropoietin zugegeben, die Mischung in Ampullen sterilfiltriert und schonend bei unter -20° C lyophilisiert wird.

40 12. Verfahren zur Herstellung eines Erythropoietin-Präparates gemäß Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst alle Hilfsstoffe in Wasser gelöst werden, das Erythropoietin zugegeben und die Mischung in Ampullen abgefüllt wird.

45

50

55